



BASE
NON-PRINTABLE





Caution: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

تحذير: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

Composition:

Active ingredient:

Paclobotrazol 0.39% g/l ww

(CAS #76738-62-0)

Inert 96.00 g/l

Total 100%

المكونات

المادة الفعالة:

باكلوبوترازول ٠,٣٩ جم/لتر و/و

(رقم دائرة خدمات المستحضرات الكيميائية ٠٠-٦٢-٧٦٧٣٨)

مكونات أخرى ٩٦ جم/لتر

الإجمالي: ١٠٠%

Agent & Distributor: Polyclean LLC.

P.O.Box 55023, Dubai, UAE.

Tel: 043388226

استيراد و توزيع في الإمارات: بوليكلين.

ص.ب ٥٥٠٢٣ - دبي - الإمارات، تليفون: ٤٣٣٨٨٢٢٦

refer to inkjet print

انظر إلى الختم

المطبوع

رقم التشغيل / Batch No:

تاريخ الانتاج / Manf. date:

تاريخ الانتهاء / Exp. date:

L1046701 UAEM/10W_PPE 4100247



syngenta.

Plant Growth Regulator

منظم نمو للنباتات



For managing growth, improving quality and stress tolerance, for plants

لتنظيم نمو النبات وتحسين نوعيته ومقاومته للظروف الصعبة

Manufacturing Company: Syngenta Crop Protection AG

Country of Origin: France

افتاح: شركة سينجنتا كروب بروتكشن

بلد المنشأ: فرنسا

MOCCA Registration Number

رقم تسجيل المبيد بوزارة التغير المناخي والبيئة
DXB-AD-140-2271

1 لتر 1 Litre

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Direction for Use:

Bonzi is a plant growth regulator for use on ornamental plants grown in containers in nurseries, greenhouses, shade houses, and interior scapes. Use of Bonzi effectively reduces internode elongation, resulting in more desirable compact plants. When used as directed, Bonzi produces no phytotoxic effects.

DO NOT REUSE POTS, TRAYS, OR OTHER CONTAINERS THAT PREVIOUSLY WERE USED IN THE PRODUCTION OF A CROP WHICH WAS TREATED WITH BONZI.

طريقة الاستخدام:

بونزي منظم نمو للنباتات يوفر نمو أكثر تماسكاً للنبات مع توازن أفضل للنباتات الجذعية والزهرية، حيث يعمل على الحد من نمو السيقان وزيادة عدد الأفرع. ويعمل أيضاً على تقليل حجم العقد الداخلية من خلال التدخل مع تركيب أحماض الجبريليك المسؤولة عن استطالة الخلايا. يمكن امتصاص الباكلوبوترازول عبر الجذور، والسيقان، والأوراق. ثم يخرج عبر النسج الخشبي للنبات.

يسمح استخدام بونزي للنبات بتحمل الضغط أثناء الزراعة بشكل أفضل، ثم في سلسلة التوزيع (النقل، والتخزين، ونقص الضوء).

750ml

500ml

250ml

approx. measure



PRINT AREA
214 x 115 mm

Precautionary Statement:

Hazard to Humans and domestic animals. Cautious. Harmful if absorbed through skins, Causes eye irritation. Prolonged and frequent repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Avid contact with skin, eyes or clothing. Avoids breathing vapor or spray mist.

PPE: Labors must wear long sleeved shirts and long pants, chemicals resistant gloves (e.g. butyl rubber, nitrile rubber, neoprene rubber, or barrier laminate gloves), Shoes plus socks.

User safety recommendations:

Users should wash hand before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or suing the toilets.

Remove clothing / PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put clean clothing.

Safety while spraying:

Like all chemical substances, avoid the exposure to the pesticide spray. Masks should be used to cover the nose and mouth during spraying. Eye visors should be worn when spraying upwards, or in treated areas. Do not apply directly on food. Avoid applying the pesticide over rivers or water inhabited by fish. The disposal of the excess pesticide spray mixture should be in accordance with the approved procedures agreed upon, and in the areas specified for this issue. Wash your body, change your clothes and wash your work clothes. Do not refill the container after use. Puncture and dispose it according to the set regulations. Keep the original container of the pesticide closed when not in use. Do not store near food. Keep out of the reach of children.

Environmental Hazardous:

Don't apply directly to water or to areas where surface water is present or to intertidal area below the mean high water mark. Don't contaminate fresh water source with this products spraying or spray leftover. Do not graze or feed clipping from treated turf areas to animals. Do not apply Headway to turf by air.

Storage & Disposal:

Keep the pesticides in its original container inside a well ventilated store house away from food, & children. The container is non refillable. Don't re-use or re fill. Triple rinse containers promptly after emptying by emptying remaining content in spraying tank and drain for 10 seconds. Fill ¼ of container with water and seal the container and rinse for 10 sec. empty rinsate in the spraying tank. Repeat this procedure for 2 times. Offer he container for disposal in designated chemical waste land fill area or burn it.

Warranty Statement:

the company guarantees the stability of the chemical & physical specifications in its original container under the normal storage conditions in UAE until it's expiry date.

بيانات تحذيرية:

المخاطر على الانسان والحيوانات الاليفة. تنبيه هذا المنتج ضار في حال امتصاصه عبر الجلد. يُمكن أن يؤدي الاستخدام الدائم أو المُتكرر للمنتج إلى تهيج البشرة في بعض الحالات. لذا تجنب ملامسة المنتج للبشرة والعينين والملابس. تجنب استنشاق البخار أو الرذاذ المتطاير من المنتج.

يجب على المستخدمين ارتداء: قمصان طويلة الأكماء وسراويل طويلة. فتازات مقاومة للمواد الكيميائية (مثل معطاط البيوتيل، ومعطاط النيتريل، ومعطاط النوبيرين. او الفتازات الصفاتحجية العازلة) احذية وجوارب.

توصيات خاصة بسلامة المُستخدم

يتعيّن على المُستخدم غسل اليدين قبل تناول الطعام أو الشراب أو مضغ البان أو تدخين التبغ أو استخدام المرحاض.

التخلص من ملابس معدات الوقاية الشخصية على الفور عقب الانتهاء من استخدام المُنتج على الفور في تدرج مبيد الافات الداخِل ثم غسلها جيدا وارتداء ملابس جديدة ويرجى إبعاد المنتج عن العينين، أو البشرة أو الملابس، وتجنب استنشاق البخار أو الرذاذ المتناثر.

السلامة عند الرش :

كما هو متبع مع جميع المواد الكيماوية تجنب ملامسة رذاذ الرش .

يجب وضع كامسة لتنظيفه الأنف والتم. يجب إرتداء واقي للعيون عند الرش إلى اعلي أو في الأماكن المحصورة. لا ترش مباشرة نحو الطعام.

تجنب رش اليبود فوق الإنهار أو في المياه الأهله بالأسماك.

يجب التخلص من محلول الرش الفائض عند الإستعمال حسب الإجراءات الموافق عليها و في الأماكن المخصصة لذلك.

اغسل غير ملاسك اغسل ثياب عمكك: لا تعيد إستعمال العبوة بعد إفرغها. اقطع أو القب العبوة وتخلص منها حسب القوانين الموضوعه.

احفظ المبيد في عبوته الأصلية محكم الإغلاق بعيد عن متناول الأطفال و أماكن تخزين الطعام.

المخاطر البيئية :

لا تضع المُنتج مباشرة إلى الماء أو في المناطق التي تحتوي على مياه سطحية أو في المناطق التي تضع ضمن علامة ذروة الحد. احرص على عدم تلوث المياه النظيفه عند التخلص من الماء المستخدم في غسل المعدات و المياه بالمنتجات الملوثة.

لا تستخدم نارج فص المسطح المعالج كلف للحيونات. لا تستخدم المنتج على المسطح الاخضر باستخدام ماكينات الرش الجوية.

التخزين والتخلص من العبوات:

يحفظ المبيد بعبواته الأصلية داخل مخزن جيد التهوية بعيدا عن الأطعمة والأغلاف وبعيدا عن الأطفال العبوة من النوع خيز قابل لاعادة الملء. لذا لا تقدم على اعادة استخدامها او ملئها. افرغ ما تبقى من محتويات العبوة في معدات الرش ثم اترك العبوة لتعصف محتوياتها لمدة ١٠ ثواني .

املأ العبوة ب ¼ حجمها ماء ثم اعد غلقها واستمر في الرج ١-٢ ثواني ثم افرغ محتوياتها في خزان الرش. كرر هذه الخطوة مرتين .

يمكن بعد ذلك التخلص من العبوة في مكبات التمامة الصحية المصرح بها أو حرقها.

الضمان :

تضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد وسلامة عبواته الأصلية في التخزين العادي طيلة فترة صلاحيته تحت ظروف دولة الإمارات العربية المتحدة.

Dose rates معدل الاستخدام

| Efficacy, time of application, Remarks الفعالية، وقت الاستخدام / الملاحظات | Dose ml/liter الجرعات (مل / لتر) | Plants النباتات |
|--|-------------------------------------|--|
| Upon plant elongation, repeat as necessary في بداية الاستطالة. كرر العملية عند اللزوم | 5 الى 2.5 | رعي الحمام الهجين والتاينين Verveines hybride |
| 7 days after pruning ٧ أيام بعد التشذيب | 5.2 الى 1.5 | Bougainville Hybride الجهنمية الهجينة |

First aid: If on skin, or cloths, Take off contaminated clothing.

- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If in Eyes, Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.

- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE TO PHYSICIAN: If a large amount has been ingested, lavage stomach. An aqueous suspension of activated charcoal can be given to absorb remaining toxicant. Treat symptomatically
Antidote: Treat symptomatically

الإسعافات الأولية :

في حال ملامسة الجلد او الملابس: خلع الملابس الملوثة. شطف الجلد على الفور بكمية وفيرة من المياه لمدة ١٥-٢٠ دقيقة . الاتصال باحد مراكز مكافحة السموم او طبيب لتقديم النصح بشأن العلاج.

في حالة اصابة العينين: ابقاء العين مفتوحة مع شطفها بلطف وبالماء لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة. ازالة العدسات اللصقة -ان وجدت- بعد مرور الـ ٥ دقائق الاولى ثم متابعة الشطف . الاتصال باحد مراكز مكافحة السموم او طبيب لتقديم النصح بشأن العلاج.

تنبيه للطبيب : في حال ابتلاع كمية كبيرة ، يجب غسل المعدة ،ويمكن ايضا العلاج من خلال تعليق مائ من الفحم النباتي النشط لامتصاص الكمية المتبقية من المادة السامة . ثم قم بالعلاج حسب الاعراض التي تظهر .

الجرعة المضادة : تعالج الاعراض حسب ظهورها

User's risk: Since the manufacturer cannot control the application, use, storage or processing of the product, the user bears the risk for damage resulting from factors beyond the manufacturer's control.

مسؤولية المستعمل: يتحمل المستعمل مسؤولية كل الأخطار و الأضرار الناتجة عن عوامل ليست من إرادة الصانع. لا يتحمل الصانع أي ضرر ناتج عن استعمال أو تخزين غير مطابقين للتوصيات.

Dose rates معدل الاستخدام

| Efficacy, time of application, Remarks الفعالية، وقت الاستخدام / الملاحظات | Dose ml/liter الجرعات (مل / لتر) | Plants النباتات |
|--|-------------------------------------|--|
| upon injection and after pruning, repeat as necessary في بداية الحقن بعد التشذيب الميكانيكي. كرر العملية حسب الضرورة | 2.5 | Brachycome الزهرة العصوية |
| upon elongation, only wet parts في بداية الاستطالة. الأجزاء الرطبة | 2.5 الى 1.5 | Calcareous hybride الكالسيومولاريا الهجينة |
| upon elongation repeat as necessary في بداية الاستطالة. استمر في التكرار | 2.5 الى 1.5 | Calcareous rugose الكالسيومولاريا روجوسا |
| upon elongation, repeat as necessary في بداية الاستطالة. كرر العملية حسب الضرورة | 5 الى 2.5 | Capsicum annum فليفلة حولية |
| Till 10 October حتى ١٠ أكتوبر | 5.2 الى 1 | Poinsettia بنت الفنصل |
| Leaves formation, repeat 10-15 days في وقت تكوين الأوراق. استخدم ماء نظيف (مطر). واستمر في التكرار على مدد زمنية من 10 إلى 15 يوم | 1 | Poinsettia a bracteas plus colors بنت الفنصل ذات الأوراق الملونة على نحو أكثر |
| Upon budding على أقصى تقدير أثناء تكوين براعم الزهور | 5 الى 2.5 | الجودان في أصيص Renoncules pot |
| upon plant elongation في بداية الاستطالة | 2.5 | Schizanthus wisetonensis زهرة الفراشة الباذنجانية |
| repeat application كرر الاستخدام | 5 الى 2.5 | Petunia بتونيا |
| after pruning 1-2 cm بعد تشذيب النباتات من 1 إلى 2 سم | 2.5 | Petunia bells بتونيا الأجراس |



NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.

